

SOSPENSIONI TEMPORANEE

Elenchiamo una serie di problematiche comunemente segnalate che comportano una sospensione temporanea dalle donazioni.

Si tratta ovviamente di una sintesi, quindi per i casi non segnalati, per approfondimenti, o in caso di dubbi, il donatore è invitato a contattare il medico della propria sezione.

EVENTO	SOSPENSIONE
Influenza o febbre superiore a 38°C	2 Settimane dopo la guarigione clinica
Raffreddore	sospensione limitata alla fase acuta
Assunzione di aspirina, antinfiammatori non steroidei, antidolorifici	Nessuna sospensione (se occasionale) Solo in caso di donazione di piastrine sospensione di 7 giorni dall'ultima assunzione
Assunzione di antibiotici o antimicotici	7 giorni dall'ultima assunzione; valutazione medica
Pulizia dentale (detartrasi), cura dentale, lavoro di protesi	48 ore
Intervento odontoiatrico minore con anestesia locale	7 giorni dalla guarigione
Impianto dentale	30 giorni dalla guarigione
Allergia	Esclusione temporanea per tutto il periodo sintomatico
Vaccinazione anti allergica	72 ore
Vaccinazione contro rosolia, tubercolosi, febbre gialla, morbillo, antivaiole, antipolio orale, parotite	1 mese
Vaccinazione contro tetano (non con siero), influenza, difterite, pertosse, febbre tifoide e paratifoide, colera, rabbia (a scopo profilattico)	48 ore
Vaccinazione contro epatite A e B	48 ore se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione
Sieroprofilassi con emoderivati (es. contro tetano o epatite B)	4 mesi
Viaggio in paese extraeuropeo non tropicale e non malarico	1 mese dal rientro
Viaggio in zona tropicale	3 mesi se al rientro non si segnalano episodi febbrili
Viaggio in zona malarica (con o senza profilassi)	6 mesi se al rientro non si segnalano episodi febbrili
Soggiorno per oltre 6 mesi, anche se non continuativi, nel Regno Unito, dal 1980 al 1996. Trasfusioni allogene nel Regno Unito dopo il 1980	sospensione definitiva



EVENTO	SOSPENSIONE
Agopuntura (se non se non si può documentare che è stata praticata da medico autorizzato, con utilizzo di aghi a perdere)	4 mesi
Tatuaggi, piercing, foratura dei lobi auricolari	4 mesi
Ciclo mestruale	non si può donare durante il ciclo
Parto	1 anno
Interruzione gravidanza	6 mesi
Assunzione di pillola anticoncezionale	nessuna sospensione
Rapporti sessuali con potenziale trasmissione di malattie infettive (rapporti occasionali protetti o non)	4 mesi. L'abitudine a tali tipi di rapporti costituisce criterio di esclusione definitiva. Valutazione medica
Esposizione accidentale a sangue o a strumenti contaminati con sangue, spruzzo di sangue sulle mucose	4 mesi
Trasfusioni di sangue	4 mesi
Endoscopie (gastroscopie, colonscopie...)	4 mesi
Interventi chirurgici	Generalmente 4 mesi, ma il medico può variarla in base alla valutazione della patologia sottostante e della guarigione chirurgica.